

## Co škodí zimní zahradě



### Plíseň sněžná

**Největší zimní nebezpečí pro trávník představuje plíseň sněžná. Tato houbová choroba zanechává na zeleném koberci stopy v podobě šedohnědých skvrn** o průměru až půl metru. Tráva v nich je vlhká, slizovitá a postupně odumírá. Na okrajích skvrn jsou někdy vidět bílá až narůžovělá houbová vlákna. Plíseň sněžná se objevuje hlavně v trávnících, které jsou příliš bohatě hnojené dusíkem.

**Na podzim nepoužívejte běžné hnojivo, ale speciální podzimní, které obsahuje více draslíku.** Ten odolnost trav vůči plísni zvyšuje. **Pomůže i pravidelná vertikutace, vhodná výška sečení a pravidelné hrabání spadaného listí.** Rozvoji plísně svědčí i kyselá půda. Máte-li ji na zahradě, je dobré na podzim trávník povápnit. Těžké půdy neválcujte, zhutnění vznik plísně podporuje. Při vyšším stupni napadení je dobré po konci vegetační doby na podzim a před jejím začátkem na jaře porost ošetřit fungicidem.

### Přezimující škůdci

Patří mezi ně **sviluška, mšice, štítenka, puklice, obaleč a řada dalších**. Kdybyste je hledali, najdete nejrozličnější vývojová stadia od vajíček až po dospělé jedince. **Přes zimu jejich přítomnost stromům nevádí, ale na jaře, když se vylíhnou, nebo během sezony dokážou nadělat spoustu nepříjemností.** Nejlépe se těchto škůdců zbavíte několika předjarními postřiky speciálními přípravky. **Postřík provedte na začátku rašení**, u jádřovin můžete přípravek použít až do začátku tvorby květního pupenu.

# Kadeřavost broskvoní

Když jsou v době rašení broskvoně a mandloně vystaveny deštivému a vlhkému počasí, napadá je kadeřavost broskvoní. **Projevuje se červenými puchýřky na mladých listech, jejich následným kroucením a opadem.** Předejít této chorobě lze **postříkem ve správnou dobu**, a to ve dvou obdobích roku. První se provádí na podzim hned po opadu listů, druhý přichází na řadu na jaře v době rašení vrcholových pupenů, když teplota vystoupí na 7 až 10 °C. Je nutné postříkat celý strom včetně kmene.